

◆オミクロンワクチン接種の概要◆

(1) オミクロンワクチン接種対象者

オミクロンワクチン	1・2回目未接種	3回目以降の接種対象者	
		12歳以上	18歳以上
ファイザー社ワクチン (BA.1及びBA.4/5)	× (使用不可)	○	○
モデルナ社ワクチン (現時点でBA.1のみ)	× (使用不可)	×	○

※これまでの接種回数に関わらず、オミクロンワクチンは一人1回の接種となります。

※1・2回目接種を完了しており、前回接種から3か月経過していることが必要です。

(2) 接種券

これまでと同様に、接種券一体型予診票を使用します。

(3) 使用ワクチン

令和4年10月28日以降はファイザー社ワクチンについてBA.4/5を使用、モデルナ社ワクチンは現時点でBA.1を使用(BA.4/5が薬事承認となれば切替予定)することとなっています。

(4) オミクロンワクチン接種の注意点

① 接種時に必要となるもの

- ・接種券一体型予診票 (接種前に予診票の項目記載必要)
- ・新型コロナワクチン予防接種済証 (臨時接種)
- ・本人確認書類 (健康保険証や介護保険証など)

② オミクロンワクチン接種後について

接種後15分～30分はワクチン接種後の副反応等による体調変化に留意してください。

③ 施設従事者の接種について

接種対象者かつ接種時期が到来しており、接種券が手元にある場合は同時接種可能です。

④ オミクロンワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種について

インフルエンザワクチンとの同時接種は可能となります。それ以外のワクチンとの同時接種は不可であり、一方のワクチンを接種後2週間の間隔を空ける必要があります。

(5) 新型コロナワクチン種類と特性 (現時点)

種類 特性	ファイザー社 (オリジナル株の 12歳以上用ワクチン)	ファイザー社 (オリジナル株・BA.4/5株 の2価ワクチン)	モデルナ社 (オリジナル株のワクチン)	モデルナ社 (オリジナル株・BA.1株の 2価ワクチン)
希釈	生理食塩水1.8mlで希釈	希釈不要	希釈不要	希釈不要
接種量	初回(1・2回目):0.3ml 追加(3回目以降):0.3ml	追加(3回目以降):0.3ml	初回(1・2回目):0.5ml 追加(3回目以降):0.25ml	追加(3回目以降):0.5ml
抗原量	オリジナル株30 μ g	オリジナル株15 μ g +BA.4/5株15 μ g=30 μ g	初回:オリジナル株100 μ g 追加:オリジナル株50 μ g	追加:オリジナル株25 μ g +BA.1株25 μ g=50 μ g
1バイアルの 単位	6回分(特殊な針・シリンジ)	6回分(特殊な針・シリンジ)	初回:10回分 追加:15回分以上	追加:5回分
保管温度	-75°C \pm 15°C:15か月 -20°C \pm 5°C:14日 2~8°C:1か月	-75°C \pm 15°C:12か月 -20°C \pm 5°C:不可 2~8°C:10週	-20°C \pm 5°C:9か月 2~8°C:30日(※) (※9か月の有効期間中に限る)	-20°C \pm 5°C:9か月 2~8°C:30日(※) (※9か月の有効期間中に限る)
備考	・希釈後、室温で6時間以内に使用する(再凍結は不可)	・室温では24時間以内に使用する ・一度針を刺した後は12時間以内に使用、解凍後の再凍結は不可	【一度針をさしたもので以降】 2~25°Cで12時間 (解凍後の再凍結は不可)	【一度針をさしたもので以降】 2~25°Cで12時間 (解凍後の再凍結は不可)