

その長引くせきやたん、 病気かも

シーオーピーディー COPD (慢性閉塞性肺疾患)



たばこ煙等の有害物質を長期に吸い込むことで生じる肺の炎症性疾患です。長年たばこを吸っている中高年に発症し、労作時の呼吸困難に陥ってしまいます。放っておくと、呼吸の状態は元には戻りません。

⚠️ こんな症状はありませんか？



動いた時の
“息切れ”



長く続く
“咳・痰”



COPDの未治療者は約530万人。

「年のせい」「風邪の治りが悪いだけ」という思い込みは危険。
症状が長引く際は早期に受診を。

COPDについて、
高知市民の約7割は
“どんな病気か知らない”
のが現状です。

令和5年度高知市健康づくりアンケートより



今からでも、
できること



まずは「禁煙」から



予防と治療の基本は禁煙です。

COPDは、受動喫煙でもなりえます。あなたが禁煙することで、家族や周囲の大切な人の健康を守ることができます。

COPDの原因の約90%は、たばこの煙

あなたに合った禁煙方法をチェック！



1 まずは、あなたのニコチン依存度をチェック

ファーストロームニコチン依存度指数 (FTND)

	質問	回答	得点
1	起床後何分で最初の喫煙をしますか？	5分以内 6～30分 31分～60分 61分以上	3 2 1 0
2	寺院や図書館、映画館など、喫煙を禁じられている場所で禁煙することが難しいですか？	はい いいえ	1 0
3	1日の喫煙の中で、どちらが一番やめにくいですか？	朝、最初の1本 その他	1 0
4	1日に何本吸いますか？	31本以上 21～30本 11～20本 10本以下	3 2 1 0
5	他の時間帯より、起床後数時間に多く喫煙しますか？	はい いいえ	1 0
6	ほとんど1日中、床に伏している病気の時も喫煙しますか？	はい いいえ	1 0
	合計点数		_____点

2 判定 (1～6の回答の点数を合計してください)

あなたに合った禁煙方法はこちら！

点数	ニコチン依存度
0～3点	ライト（低）スモーカー
4～6点	ミドル（中）スモーカー
7～10点	ヘビー（高）スモーカー

- 禁煙の意思とたばこに代わるストレス対処法により自力でも禁煙できます
- ガムやパッチなどを活用し禁煙してみよう（薬局などで購入可）
- 禁煙外来の受診をすすめます



禁煙は何歳からでも遅くありません。禁煙を始めた直後から多くのメリットがあります。あなたの禁煙を応援しています。（ホームページもチェック→）



お問い合わせ先：高知市保健所健康増進課 TEL:088-803-8005