

# 緊急時フローチャート

## (1) 初期対応

発見者が行うこと ① 子どもから目を離さない、一人にしない ② 助けを呼び、人を集める ③ エピペン <sup>®</sup> と内服薬を持ってこよう指示する	処置 原因食物が皮膚につく⇒洗い流す 原因食物を口に入れる⇒口から出す、吐かせる、口をすすぐ 眼症状（かゆみ・充血・むくみ）⇒洗眼する
--	--

## (2) 応援体制の確保 ⇒資料A「園内での役割分担」

## (3) 症状レベルに応じた対応

- アレルギー症状があったら、5分以内に判断する。 ●迷ったらエピペン<sup>®</sup>を使用する。ただちに119番通報する。
- 症状は急激に変化する可能性がある。 ●少なくとも5分毎に症状を注意深く観察する。

症状のチェックは緊急性が高い、左の欄から行う

全身	<input type="checkbox"/> ぐったり <input type="checkbox"/> 意識がもうろう <input type="checkbox"/> 尿や便を漏らす <input type="checkbox"/> 脈が触れにくいまたは不規則 <input type="checkbox"/> 唇や爪が青白い		
呼吸器	<input type="checkbox"/> のどや胸が締め付けられる <input type="checkbox"/> 声がかすれる <input type="checkbox"/> 犬が吠えるような咳 <input type="checkbox"/> 息がしにくい <input type="checkbox"/> 持続する強い咳き込み <input type="checkbox"/> ゼーゼーする呼吸	<input type="checkbox"/> 数回の軽い咳	
消化器	<input type="checkbox"/> 持続する強いお腹の痛み (がまんできない痛み) <input type="checkbox"/> 繰り返し吐き続ける	<input type="checkbox"/> 中等度のお腹の痛み <input type="checkbox"/> 1～2回の嘔吐 <input type="checkbox"/> 1～2回の下痢	<input type="checkbox"/> 軽いお腹の痛み (がまんできる痛み) <input type="checkbox"/> 吐き気
目・鼻 口・顔	<div style="background-color: red; color: white; padding: 10px; text-align: center;">                     上記の症状が 1つでもあてはまる場合   <h1 style="margin: 0;">緊急</h1> </div>	<input type="checkbox"/> 顔全体の腫れ <input type="checkbox"/> まぶたの腫れ	<input type="checkbox"/> 目のかゆみ、充血 <input type="checkbox"/> 口の中の違和感 <input type="checkbox"/> くしゃみ、鼻水、鼻づまり
皮膚		<input type="checkbox"/> 強いかゆみ <input type="checkbox"/> 全身に広がるじんま疹 <input type="checkbox"/> 全身が真っ赤	<input type="checkbox"/> 軽度のかゆみ <input type="checkbox"/> 数個のじんま疹 <input type="checkbox"/> 部分的な赤み
		<div style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">                     1つでもあてはまる場合   <h1 style="margin: 0;">受診</h1> </div>	<div style="background-color: #d3d3d3; padding: 10px; text-align: center;">                     1つでもあてはまる場合   <h1 style="margin: 0;">経過観察</h1> </div>
	<b>ただちに救急車で医療機関へ搬送</b> ① ただちにエピペン <sup>®</sup> を使用 ⇒資料B「エピペン <sup>®</sup> の使用法」 ② 救急車を要請(119番) ⇒資料C「救急車要請(119番通報)のポイント」 ③ その場で安静を保つ (立たせたり、歩かせたりしない) ⇒P8表2「安静を保つ体位」 ④ その場で救急隊を待つ ⑤ 可能なら内服薬を飲ませる	<b>速やかに医療機関を受診</b> ① 内服薬を飲ませ、エピペン <sup>®</sup> を準備 ② 速やかに医療機関を受診(救急車の要請も考慮) ③ 急速な症状悪化の場合 ⇒「緊急」の対応	<b>安静にし注意深く経過観察</b> ① 内服薬を飲ませる ② 急速な症状悪化の場合 ⇒「受診」「緊急」の対応 ③ 少なくとも1時間は、5分毎に症状の変化を観察し、症状の改善がみられない場合は医療機関を受診